

## Del 1 - Sannolikhetsteori

### Sannolikhet och händelser

- Additionssatsen:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Betingad sannolikhet:  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- A och B är oberoende  $\iff P(A \cap B) = P(A) P(B)$ .
- Bayes sats:  $P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$
- Satsen om total sannolikhet:  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | H_i) P(H_i)$   
om  $H_i \cap H_j = \emptyset$  då  $i \neq j$  och  $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$ .

### Fördelningsfunktionen $F(x)$

- För en diskret stokastisk variabel  $\xi$  är  
 $F(x_k) = P(\xi \leq x_k) = \sum_{i=1}^k P(\xi = x_i)$ , då  
 $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ , för sannolikhetsfunktion  $P(\xi = x_i)$ .
- För en kontinuerlig stokastisk variabel  $\xi$  är  
 $F(x) = P(\xi \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ , för frekvensfunktion  
 $f(t) = F'(t)$ .

### Väntevärde, Varians och Standardavvikelse:

- Väntevärde: För en stokastisk variabel  $\xi$  och en funktion  $g: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  är:

$$E(g(\xi)) = \begin{cases} \sum g(x_i)P(\xi = x_i), & \xi \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(t)f(t)dt, & \xi \text{ kontinuerlig} \end{cases}$$

- Varians:  $V(\xi) = E((\xi - E(\xi))^2) = E(\xi^2) - E(\xi)^2$ .
- Standardavvikelse:  $D(\xi) = \sqrt{V(\xi)}$
- Linjärkombination av stokastiska variabler:

$$E\left(\sum_i a_i \xi_i + b\right) = \sum_i a_i E(\xi_i) + b$$

$$V\left(\sum_i a_i \xi_i + b\right) = \sum_i a_i^2 V(\xi_i), \quad \xi_1, \dots, \xi_n \text{ ober.}$$

- Medelvärde  $\bar{\xi}$ , dvs. fallet  $a_i = 1/n$  och  $b = 0$  från ovan, ger

$$E(\bar{\xi}) = E(\xi), \quad V(\bar{\xi}) = \frac{V(\xi)}{n}, \quad \xi_1, \dots, \xi_n \text{ ober.}$$

### Linjära funktioner av stokastiska variabler

- Om  $\xi_1$  och  $\xi_2$  är oberoende s.v. så gäller:

$$\begin{cases} \xi_1 \in \text{Bin}(n_1, p) \\ \xi_2 \in \text{Bin}(n_2, p) \end{cases} \Rightarrow \xi_1 + \xi_2 \in \text{Bin}(n_1 + n_2, p).$$

$$\begin{cases} \xi_1 \in \text{Po}(\mu_1) \\ \xi_2 \in \text{Po}(\mu_2) \end{cases} \Rightarrow \xi_1 + \xi_2 \in \text{Po}(\mu_1 + \mu_2).$$

- Om  $\xi_1 \in N(\mu_1, \sigma_1)$  och  $\xi_2 \in N(\mu_2, \sigma_2)$  är oberoende och  $a$  och  $b$  konstanter är:

$$a\xi_1 + b\xi_2 \in N\left(a\mu_1 + b\mu_2, \sqrt{a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2}\right)$$

- För en normalfördelad s.v.  $\xi \in N(\mu, \sigma)$  kan fördelningsfunktionen beräknas numeriskt med

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-(x - \mu)}{\sigma}\right),$$

där  $\Phi$  är fördelningsfunktionen för den standardiserade normalfördelningen,  $\frac{\xi - \mu}{\sigma} \in N(0, 1)$ , för vilken numeriska värden finns tabulerade.

### Några icke-linjära funktioner av s.v.

Låt  $\xi_1, \dots, \xi_n$  vara oberoende och likafördelade s.v. med fördelningsfunktion  $F(x)$ . Då gäller för:

- Minsta värde,  $\eta = \min(\xi_1, \dots, \xi_n)$ , har fördelning  
 $F_\eta(x) = 1 - (1 - F(x))^n$
- Största värde,  $\omega = \max(\xi_1, \dots, \xi_n)$ , har fördelning  
 $F_\omega(x) = F(x)^n$

### Centrala gränsvärdessatsen

Om  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  är ett oberoende och likafördelat stickprov av  $\xi$ :  $E(\xi) = \mu$ ,  $V(\xi) = \sigma^2$  så är för stora  $n$ :

$$\eta = \sum_{i=1}^n \xi_i \in N(n\mu, \sqrt{n}\sigma) \Rightarrow \bar{\xi} = \frac{1}{n}\eta \in N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

Tumregler för approximationer:

Binomial  $\rightarrow$  Normal om  $np(1-p) \geq 10$ .  
Poisson  $\rightarrow$  Normal om  $\mu \geq 15$ .

### Gauss approximationsformler:

För en funktion av stokastisk variabel,  $g(\xi)$ , där  $\mu = E(\xi)$  och  $\sigma^2 = V(\xi)$ , kan funktionens väntevärde och varians approximeras med:

$$E(g(\xi)) \approx g(\mu), \quad V(g(\xi)) \approx [g'(\mu)]^2 \cdot \sigma^2.$$

## Del 2 - Statistikteori

### Punktskattningar

#### Ett stickprov

Låt  $x_1, \dots, x_n$  vara observationer av ett oberoende och likafördelat stickprov  $\xi_1, \dots, \xi_n$  från den s.v.  $\xi$  med okänt väntevärde  $\mu$  och standardavvikelse  $\sigma$ . Väntevärdes- riktiga skattningar av  $\mu$  och  $\sigma^2$  är då

$$\mu_{obs}^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$
$$(\sigma^2)_{obs}^* = s^2 = \frac{Q}{n-1} = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n (x_i^2) - n\bar{x}^2 \right)$$

#### Korrelationskoefficient

Låt  $x_1, \dots, x_n$  och  $y_1, \dots, y_n$  vara två uppsättningar observationer. Korrelationskoefficienten mellan dessa beräknas som:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

### Konfidensintervall under normalfördelning

#### Intervall för parameter $\theta$

När parametern  $\theta$  skattas med  $\theta^* \in N(\theta, D(\theta^*))$  så ges ett konfidensintervall med konfidensgrad  $1 - \alpha$  av:

$$I_\theta = \theta^* \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot D(\theta^*), \quad \text{om } D(\theta^*) \text{ är känd}$$
$$I_\theta = \theta^* \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot d(\theta^*), \quad \text{för skattad } d(\theta^*) \text{ då CGS använts.}$$
$$I_\theta = \theta^* \pm t_{\alpha/2}(f) \cdot d(\theta^*), \quad \text{för skattad } d(\theta^*) = c \cdot \sigma^*, \text{ där } \sigma_{obs}^* = s = \sqrt{Q/f}$$

Avrundning görs så att konfidensgraden är minst  $1 - \alpha$ .

#### Intervall för väntevärde

För väntevärdet  $\mu$ , om det skattas med stickprovsmedel  $\mu^* = \bar{x}$ , blir det observerade konfidensintervallet:

$$(I_\mu)_{obs} = \bar{x} \pm \lambda_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \text{om } \sigma \text{ är känd}$$
$$(I_\mu)_{obs} = \bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \text{då } \sigma \text{ skattas enl. ovan}$$

### Jämförelse av väntevärde under normalfördelning

#### Stickprov i par

När observationer  $(x_i, y_i)$  kan grupperas parvis kan skillnaden i väntevärde studeras genom följande modell:

$$\left. \begin{array}{l} \xi_i \in N(\mu_i + \Delta, \sigma_i) \\ \eta_i \in N(\mu_i, \sigma_i) \end{array} \right\} \Rightarrow \zeta_i = \xi_i - \eta_i \in N(\Delta, \sigma),$$

med observationer  $z_i = x_i - y_i$  för  $i = 1, \dots, n$ . Ett konfidensintervall för  $\Delta$  kan konstrueras som ovan.

### Två oberoende stickprov

För två oberoende stickprov;  $x_1, \dots, x_{n_1}$  från  $\xi \in N(\mu_1, \sigma_1)$  och  $y_1, \dots, y_{n_2}$  från  $\eta \in N(\mu_2, \sigma_2)$  blir förväntad skillnad:

$$\mu_1^* - \mu_2^* = \bar{x} - \bar{y} \in N\left(\mu_1 - \mu_2, \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$$
$$I_{\mu_1 - \mu_2} = \bar{x} - \bar{y} \pm \lambda_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \quad \sigma_1, \sigma_2 \text{ kända}$$
$$I_{\mu_1 - \mu_2} = \bar{x} - \bar{y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}},$$

om  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$  är okänd och skattas med den poolade standardavvikelsen,  $s_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$ , där  $s_1^2$  och  $s_2^2$  är punktskattningar för varians av respektive stickprov enligt ovan.

### Hypotestest

**Direktmetoden:** Jämför p-värdet med signifikansnivån  $\alpha$ :  
 $p = P(\text{det vi fick eller längre från } H_0 \mid H_0 \text{ sann}).$

**Konfidensintervall:** Gör en lämplig intervallskattning och jmf. med  $\theta_0$  (värdet under  $H_0$ ).

**Teststorhet:** Om skattningen  $\theta^*$  är (approx.) normalfördelad, beräkna observationen av  $T = \frac{\theta^* - \theta_0}{d(\theta^*)}$ , jmf. med  $\lambda$ - eller  $t(f)$ -kvantil.

**Styrkefunktion:**  $h(x) = P(\text{Förkasta } H_0 \mid \theta = x \text{ är rätt värde})$

**Signifikansnivå:**  $\alpha = P(\text{Förkasta } H_0 \mid H_0 \text{ är sann})$

### Enkel linjär regression

• Modell:  $\eta_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \in N(0, \sigma).$

• Parameterskattningar:

$$\alpha_{obs}^* = \bar{y} - \beta^* \bar{x}, \quad \beta_{obs}^* = \frac{S_{xy}}{S_{xx}},$$
$$(\sigma^2)_{obs}^* = s^2 = \frac{Q_0}{n-2}, \quad Q_0 = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}},$$
$$\alpha^* \in N\left(\alpha, \sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}\right), \quad \beta^* \in N\left(\beta, \frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}\right).$$
$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2, \quad S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2,$$
$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}.$$
$$\mu_0^* = \alpha^* + \beta^* x_0 \in N\left(\alpha + \beta x_0, \sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}\right).$$
$$\eta_0^* = \alpha^* + \beta^* x_0 + \varepsilon_0 \in N\left(\alpha + \beta x_0, \sigma \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}\right).$$

## Miniräknare

Funktioner för fördelningar finns med ändelserna **cdf/CD** *cumulative distribution function* (fördelningsfunktion,  $F(x) = P(\xi \leq x)$ ), **pdf/PD** *probability density function* (sannolikhets-,  $P(\xi = k) = P(\xi = k)$ , eller täthetsfunktion,  $f(x)$ ), eller **inv** *inverse cdf* (dvs  $x = F^{-1}(p)$ ). Notera att kvantil och inverse funktionen skiljer sig ( $\xi > x_\alpha$  eller  $\xi \leq x_p$ ):

**kvantil:** Finn  $x_\alpha$  så att  $P(\xi > x_\alpha) = \alpha$ .

**inverse:**  $F^{-1}(p) = x_p$  eller finn  $x_p$  så att  $P(\xi \leq x_p) = p$ .

Fördelningsfunktionerna beräknar ibland sannolikheter i ett intervall  $a < \xi \leq b$ , använd  $-1 \cdot 10^{99}$  eller  $1 \cdot 10^{99}$  för värdena  $\pm\infty$  (en mindre exponent kan eventuellt behövas men testa att den är "tillräckligt stor", dvs inte ändrar resultatet).

För att beräkna statistik och skattningar ( $\mu_{obs}^*$ ,  $s^2$ ,  $\sum x_i^2$ , etc) behöver värdena först sparas i listor.

	Texas instrument	Casio
$1 \cdot 10^x$	<b>2nd</b> → <b>EE</b> Ger $1Ex$ på räknaren.	<b>SHIFT</b> → <b>log</b> ( $10^x$ ) Ger $1 * 10^x$ på räknaren.
$k!$ & $\binom{n}{k}$	<b>MATH</b> → <b>PROB</b> → <b>!</b> <b>MATH</b> → <b>PROB</b> → <b>nCr</b>	<b>OPTN</b> → <b>PROB</b> → <b>!</b> <b>OPTN</b> → <b>PROB</b> → <b>nCr</b>
Fördelningar	<b>DISTR</b> ( <b>2nd VARS</b> ) → välj lämplig fördelning <b>normalpdf</b> ( <b>x</b> , <b><math>\mu</math></b> , <b><math>\sigma</math></b> ) eller <b>normalcdf</b> ( <b>a</b> , <b>b</b> , <b><math>\mu</math></b> , <b><math>\sigma</math></b> ) <b>binompdf</b> ( <b>n</b> , <b>p</b> , <b>x</b> ) eller <b>binomcdf</b> ( <b>n</b> , <b>p</b> , <b>x</b> ) <b>poissonpdf</b> ( <b><math>\lambda</math></b> , <b>x</b> ) eller <b>poissoncdf</b> ( <b><math>\lambda</math></b> , <b>x</b> ) <b>normalinv</b> ( <b>1-<math>\alpha</math></b> , <b><math>\mu</math></b> , <b><math>\sigma</math></b> ) för normal-kvantiler, <b><math>\lambda_\alpha</math></b> <b>tin</b> ( <b>1-<math>\alpha</math></b> , <b>f</b> ) för t-kvantiler, <b><math>t_\alpha(f)</math></b>	<b>OPTN</b> → <b>STAT</b> → <b>DISTR</b> → välj lämplig fördelning <b>Normal PD</b> ( <b>x</b> , <b><math>\sigma</math></b> , <b><math>\mu</math></b> ) eller <b>Normal CD</b> ( <b>a</b> , <b>b</b> , <b><math>\sigma</math></b> , <b><math>\mu</math></b> ) <b>Binomial PD</b> ( <b>x</b> , <b>n</b> , <b>p</b> ) eller <b>Binomial CD</b> ( <b>x</b> , <b>n</b> , <b>p</b> ) <b>Poisson PD</b> ( <b>x</b> , <b><math>\lambda</math></b> ) eller <b>Poisson CD</b> ( <b>x</b> , <b><math>\lambda</math></b> ) <b>Inverse Normal</b> för normal-kvantiler, alternativet <b>Tail</b> anger vilket håll som inversen ska beräknas (left=inverse eller right=kvantil). <b>Inverse Student-t</b> för t-kvantiler.
Listor	<b>STAT</b> → <b>EDIT</b> För att lägga in värden listorna <b>2nd</b> → <b>1 – 6</b> Hämta namn på listor för användning. Det går att räkna med och tilldela listor: Exempel: <b>2*L1-1 (STO►) L2</b>	<b>MENU</b> → <b>STAT(2)</b> För att lägga in värden listorna <b>SHIFT</b> → <b>1(List)</b> → <b>1 – 6</b> Ange namn på listor för användning. Det går att räkna med och tilldela listor: Exempel: <b>2*List 1-1 → List 2</b>
Statistik	<b>STAT</b> → <b>CALC</b> → <b>1-Var Stats</b> Beräkna sammanfattande statistik för angiven lista. Exempel: <b>1-Var Stats L1</b> <b>STAT</b> → <b>CALC</b> → <b>2-Var Stats</b> Beräkna sammanfattande statistik för två angivna listor (beräknar t.ex. $\sum x_i y_i$ som behövs för regression och korrelation). Exempel: <b>2-Var Stats L1,L2</b> <b>VARS</b> → <b>Statistics</b> → Hämta variabler som innehåller statistik som beräknats ovan.	<b>OPTN</b> → <b>CALC</b> → <b>1VAR</b> Beräkna sammanfattande statistik för angiven lista. <b>OPTN</b> → <b>CALC</b> → <b>2VAR</b> Beräkna sammanfattande statistik för två angivna listor (beräknar t.ex. $\sum x_i y_i$ som behövs för regression och korrelation). <b>VARS</b> → <b>STAT</b> → Hämta variabler som innehåller statistik som beräknats ovan.

**Användning av miniräknare på tentan:** När miniräknaren används för beräkningar på tentan måste det tydligt framgå vad som beräknats (formler), vad resultatet är och vilka slutsatser som kan dras. Att bara repetera resultat från miniräknaren utan kommentarer utgör **INTE** väl motiverade lösningar.

# Fördelningar

Fördelning			Väntevärde	Varians
Binomialfördelning, $\text{Bin}(n, p)$	$P(\xi = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$k = 0, 1, \dots, n$	$np$	$np(1-p)$
Hypergeometrisk fördelning	$P(\xi = k) = \frac{\binom{Np}{k} \binom{N(1-p)}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$0 \leq k \leq Np,$ $n-k \leq N(1-p)$	$np$	$\frac{N-n}{N-1} np(1-p)$
Poissonfördelning, $\text{Po}(\lambda)$	$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	$k = 0, 1, 2, \dots$	$\lambda$	$\lambda$
ffg-fördelning	$P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}$	$k = 1, 2, 3, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Rektangelfördelning, $R(a, b), U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$a \leq x \leq b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(a-b)^2}{12}$
Exponential- fördelning, $\text{Exp}(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$	$x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normalfördelning <sup>2</sup> , $N(\mu, \sigma)$	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$x \in \mathbb{R}$	$\mu$	$\sigma^2$
$t$ -fördelning <sup>1</sup> , $t(n)$	$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$	$x \in \mathbb{R}$	$0, n > 1$	$\frac{n}{n-2}, n > 2$
Lognormal- fördelning $\ln X \in N(m, \sigma)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \sigma^2 2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - m)^2}{2\sigma^2}}$	$x \geq 0$	$e^{m+\sigma^2/2}$	$e^{2m+\sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$

1. Gamma-funktionen,  $\Gamma(p)$ , är en generaliserad fakultet:

$$\Gamma(p) = (p-1) \cdot \Gamma(p-1)$$

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx, p > 0$$

$$\Gamma(p) = (p-1)! \text{ om } p \text{ heltal}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

# A Tabeller

## A.1 Grekiska alfabetet

$A$	$\alpha$	alfa	$N$	$\nu$	ny
$B$	$\beta$	beta	$\Xi$	$\xi$	xi
$\Gamma$	$\gamma$	gamma	$O$	$o$	omikron
$\Delta$	$\delta$	delta	$\Pi$	$\pi$	pi
$E$	$\varepsilon, \epsilon$	epsilon	$P$	$\rho, \rho$	ro
$Z$	$\zeta$	zeta	$\Sigma$	$\varsigma, \sigma$	sigma
$H$	$\eta$	eta	$T$	$\tau$	tau
$\Theta$	$\vartheta, \theta$	theta	$Y$	$\upsilon$	ypsilon
$I$	$\iota$	iota	$\Phi$	$\varphi, \phi$	fi
$K$	$\kappa$	kappa	$X$	$\chi$	chi
$\Lambda$	$\lambda$	lambda	$\Psi$	$\psi$	psi
$M$	$\mu$	my	$\Omega$	$\omega$	omega

#### A.4. Normalfördelningen

## A.4 Normalfördelningen

Tabellen ger sannolikheten  $\Phi(x) = P(\xi \leq x)$ , där  $\xi \in N(0,1)$ .


För negativa  $x$ -värden använd relationen  $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ .

[illegible]

## A.5 Normalfördelningen (forts.)

Tabellen ger det  $\lambda_\alpha$ -värde för vilket  $P(\xi > \lambda_\alpha) = \alpha$ , där  $\xi \in N(0,1)$ .

$\alpha$	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
$\lambda_\alpha$	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.0902
$\alpha$	0.0005	0.0001	0.00005	0.00001	$5.0 \times 10^{-6}$	$1.0 \times 10^{-6}$
$\lambda_\alpha$	3.2905	3.7190	3.8906	4.2649	4.4172	4.7534



## A.6 *t*-fördelningen

Tabellen ger det  $x$ -värde för vilket  $P(\xi > x) = \alpha$ , där  $\xi \in t(f)$ .

$f$	$\alpha$						
	.1	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
$\infty$	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291